CÓMO HABLAR con su médico sobre DAWNZERA

Si está considerando su primer tratamiento preventivo a largo plazo para el angioedema hereditario (AEH) o si desea evaluar si DAWNZERA puede ser adecuado para usted, esta guía puede ayudarle a prepararse para su próxima visita al médico.

Cómo usar esta guía

Encontrará consejos para hablar con su médico y preguntas que le ayudarán a obtener la información que está buscando. En la página 3 de esta guía puede encontrar una hoja de trabajo sobre los síntomas que le ayudará a reflexionar sobre cómo el AEH afectó su vida en los últimos meses.

No lo olvide

Lleve las preguntas y la hoja de trabajo al final de esta guía a su próxima visita al médico. Su médico puede ayudarle a identificar la mejor opción de tratamiento para usted.

INDICACIÓN

DAWNZERA™ (donidalorsén) es un medicamento de venta con receta que se usa para prevenir ataques de angioedema hereditario (AEH) en adultos y niños a partir de los 12 años.

Se desconoce si DAWNZERA es seguro y eficaz en niños menores de 12 años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No use DAWNZERA si ha tenido una reacción alérgica grave, incluida la anafilaxia, al donidalorsén o a cualquiera de los ingredientes de DAWNZERA.

Antes de usar DAWNZERA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si: está embarazada o planea quedar embarazada, está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si DAWNZERA puede dañar al bebé en gestación o si pasa a la leche materna y puede dañar al bebé.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERA, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERA™
(donidalorsen) 80 mg / 0.8 mL injection

TOME EL CONTROL: consejos para hablar con su médico

Consejo N.º 1

Hable sobre cómo el AEH afecta su vida

Muchas personas se pierden partes de su vida diaria debido a ataques de hinchazón de AEH y, con el tiempo, **eso puede empezar a parecer normal. Pero no tiene por qué serlo.** Incluso si recibe tratamiento, es importante que le informe a su médico cuando el AEH sigue afectando sus actividades diarias.

CONSEJO N.º 2

Informe sobre cada ataque

Incluso un solo ataque de AEH es demasiado. No dude en informar a su médico de todos los ataques, **no solo de los que considere graves.** Compartir esta información puede ayudar a su médico a comprender mejor el impacto total del AEH en su vida y cuándo puede ser el momento de ajustar su tratamiento.

CONSEJO N.º 3

Comparta sus objetivos personales de tratamiento

Lo que usted desea de su tratamiento es importante. **Su médico desea saber** todo lo posible sobre cómo le va con el AEH. El objetivo general del tratamiento para el AEH es ayudarle a vivir una vida lo más normal posible.

CONSEJO N.º 4

Prepárese para su cita

- ☐ Lleve sus preguntas. Puede usar las páginas 5 a 7 de esta guía
- ☐ Prepárese para tomar notas o pida permiso para grabar la cita
- ☐ Traiga su diario de ataques o use las hojas de trabajo sobre los síntomas que se encuentran en las páginas 3 y 4 de esta guía
- ☐ Piense en qué tan controlado se encuentra su AEH con su plan de tratamiento actual
- ☐ Piense en cuántas veces usó su tratamiento de rescate en el último mes
- ☐ Lleve a un amigo o familiar para que le ayude a tomar notas y hacer preguntas

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAWNZERA?
DAWNZERA puede causar efectos secundarios graves, como reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas pueden incluir sarpullido, dificultad para respirar, dolor en el pecho, desmayos, mareos, sensación de mareo, hinchazón de la cara, los labios o la lengua y picazón. Deje de usar DAWNZERA y llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si tiene alguno de estos síntomas.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERA, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERA™
(donidalorsen) 80 mg / 0.8 mL injection

Su hoja de trabajo de SÍNTOMAS DE AEH

Para que le sirva de guía para su próxima visita al médico, complete esta hoja de trabajo y llévela con usted.

Puede ayudarles tanto a usted como a su médico a hablar sobre su grado de satisfacción con su plan de manejo y tratamiento del AEH.

Acerca de sus ataques

¿Cuántos ataques tuvo?

___ en el último mes

___ en los últimos 3 meses

¿Qué tan severos son sus ataques?

- ☐ Leves
- ☐ Moderados
- ☐ Severos
- ☐ Muy severos

¿Con qué frecuencia usa su tratamiento de rescate?

- ☐ Una vez al mes
- ☐ Una vez cada 3 meses
- ☐ Una vez cada 6 meses
- ☐ Otra: _____

Si está recibiendo un tratamiento preventivo, ¿cuántas veces omitió una dosis?

- ☐ Nunca
- ☐ Una vez en 3 meses
- ☐ Entre 1 y 3 veces al mes
- ☐ Otra: _____

Impacto en la vida diaria

¿Qué tanto temor siente por su próximo ataque?

- ☐ Nada
- ☐ Algo de preocupación
- ☐ Siento ansiedad

En los últimos 3 meses, ¿cuántas veces dejó de hacer actividades debido a un ataque o a la preocupación por tener uno?

- ☐ Nunca
- ☐ Entre 1 y 2 veces
- ☐ 3 o más veces

Cuando se preocupó por un ataque, ¿cuáles son algunas de las actividades que evitó?

_____

_____

_____

_____

Esta hoja de trabajo se desarrolló para ayudarlo a iniciar una conversación con su médico. No está diseñada para sustituir la toma de decisiones médicas ni ofrecer asesoramiento médico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Los efectos secundarios más frecuentes de DAWNZERA incluyen reacciones en el lugar de inyección (como enrojecimiento o dolor en el lugar de inyección), infección de las vías respiratorias superiores, infección de las vías urinarias, molestia abdominal.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DAWNZERA. Informe a su proveedor de atención médica o equipo de tratamiento sobre los efectos secundarios que pueda tener.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERA, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERA™
(donidalorsen) 80 mg / 0.8 mL injection

Su hoja de trabajo de SÍNTOMAS DE AEH

Para que le sirva de guía para su próxima visita al médico, complete esta hoja de trabajo y llévela con usted.

Puede ayudarles tanto a usted como a su médico a hablar sobre su grado de satisfacción con su plan de manejo y tratamiento tratamiento del AEH.

Sus objetivos de tratamiento

¿Qué tan satisfecho está con su tratamiento actual?

Muy descontento | Descontento | Aceptable | Contento | Muy contento

¿Qué es lo más importante para usted en un tratamiento? Clasifique lo siguiente del 1 al 5; 1 es lo más importante y 5 lo menos importante:

- ___ Prevención de ataques de hinchazón
- ___ Tener menos efectos secundarios, seguridad
- ___ Cómo se administra (inyección, infusión, comprimido)
- ___ Con qué frecuencia lo utilizo
- ___ Otro (especifique): _____

Si ya está recibiendo tratamiento preventivo, ¿qué le gustaría que fuera diferente? Marque todas las opciones que correspondan:

- ☐ Todavía tengo demasiados ataques
- ☐ Se tarda mucho tiempo en prepararlo y usarlo
- ☐ Administrarlo es estresante
- ☐ Los efectos secundarios son molestos
- ☐ Tengo que usarlo con demasiada frecuencia

¿Cuáles son sus objetivos de tratamiento para el AEH?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No use DAWNZERA si ha tenido una reacción alérgica grave, incluida la anafilaxia, al donidalorsén o a cualquiera de los ingredientes de DAWNZERA.

Antes de usar DAWNZERA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si: está embarazada o planea quedar embarazada, está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si DAWNZERA puede dañar al bebé en gestación o si pasa a la leche materna y puede dañar al bebé.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERA, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERA™
(donidalorsen) 80 mg / 0.8 mL injection

PREGUNTAS para hacerle a su médico

Aquí tiene algunas preguntas que puede llevar a su próxima visita al médico.
Utilice esta página para tomar notas durante su conversación y escribir las respuestas de su médico.

Preguntas sobre sus ataques de AEH

¿Qué podría estar desencadenando mis síntomas?

¿Qué puedo hacer para reducir las probabilidades de hinchazón?

¿Recomienda alguna herramienta o recurso que me pueda ayudar?

Haga sus propias preguntas:

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAWNZERA?
DAWNZERA puede causar efectos secundarios graves, como reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas pueden incluir sarpullido, dificultad para respirar, dolor en el pecho, desmayos, mareos, sensación de mareo, hinchazón de la cara, los labios o la lengua y picazón. Deje de usar DAWNZERA y llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si tiene alguno de estos síntomas.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERA, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERA™
(donidalorsen) 80 mg / 0.8 mL injection

PREGUNTAS para hacerle a su médico

Aquí tiene algunas preguntas que puede llevar a su próxima visita al médico.
Utilice esta página para tomar notas durante su conversación y escribir las respuestas de su médico.

Preguntas sobre DAWNZERA

¿Cómo funciona este tratamiento?

¿Cuándo debo esperar ver los resultados?

¿Cómo se administra y con qué frecuencia?

¿Seguiré usando mi tratamiento de rescate?

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

En el caso de que este sea el tratamiento adecuado para mí, ¿cómo paso de mi tratamiento actual a DAWNZERA?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Los efectos secundarios más frecuentes de DAWNZERA incluyen reacciones en el lugar de inyección (como enrojecimiento o dolor en el lugar de inyección), infección de las vías respiratorias superiores, infección de las vías urinarias, molestia abdominal.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DAWNZERA. Informe a su proveedor de atención médica o equipo de tratamiento sobre los efectos secundarios que pueda tener.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERA, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERA™
(donidalorsen) 80 mg / 0.8 mL injection

PREGUNTAS para hacerle a su médico

Aquí tiene algunas preguntas que puede llevar a su próxima visita al médico.
Utilice esta página para tomar notas durante su conversación y escribir las respuestas de su médico.

Preguntas sobre DAWNZERA

¿Es seguro durante el embarazo?

¿Cómo se debe conservar DAWNZERA?

¿Qué apoyo hay disponible si estoy tomando DAWNZERA?

Haga sus propias preguntas:

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No use DAWNZERA si ha tenido una reacción alérgica grave, incluida la anafilaxia, al donidalorsén o a cualquiera de los ingredientes de DAWNZERA.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta a la FDA. Visite www.fda.gov/safety/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERA, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERA™ (donidalorsen) 80 mg/0.8 mL injection

DAWNZERA™ es una marca comercial de Ionis Pharmaceuticals, Inc. ©2026 Ionis Pharmaceuticals, Inc. US-DONI-2600147 v1.0 07/2026