

CÓMO HABLAR con su médico sobre DAWNZERA

Si está considerando su primer tratamiento preventivo a largo plazo para el angioedema hereditario (AEH) o si desea evaluar si DAWNZERA puede ser adecuado para usted, esta guía puede ayudarle a prepararse para su próxima visita al médico.



Cómo usar esta guía

Encontrará consejos para hablar con su médico y preguntas que le ayudarán a obtener la información que está buscando. En la página 3 de esta guía puede encontrar una hoja de trabajo sobre los síntomas que le ayudará a reflexionar sobre cómo el AEH afectó su vida en los últimos meses.



No lo olvide

Lleve las preguntas y la hoja de trabajo al final de esta guía a su próxima visita al médico. Su médico puede ayudarle a identificar la mejor opción de tratamiento para usted.

INDICACIÓN

DAWNZERA™ (donidalorsén) es un medicamento de venta con receta que se usa para prevenir ataques de angioedema hereditario (AEH) en adultos y niños a partir de los 12 años.

Se desconoce si DAWNZERA es seguro y eficaz en niños menores de 12 años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No use DAWNZERA si ha tenido una reacción alérgica grave, incluida la anafilaxia, al donidalorsén o a cualquiera de los ingredientes de DAWNZERA.

Antes de usar DAWNZERA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si: está embarazada o planea quedar embarazada, está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si DAWNZERA puede dañar al bebé en gestación o si pasa a la leche materna y puede dañar al bebé.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERA, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERA™
(donidalorsen) 80 mg / 0.8 mL
injection

TOME EL CONTROL: consejos para hablar con su médico

Consejo N.º 1

Hable sobre cómo el AEH afecta su vida

Muchas personas se pierden partes de su vida diaria debido a ataques de hinchazón de AEH y, con el tiempo, **eso puede empezar a parecer normal. Pero no tiene por qué serlo.** Incluso si recibe tratamiento, es importante que le informe a su médico cuando el AEH sigue afectando sus actividades diarias.

CONSEJO N.º 2

Informe sobre cada ataque

Incluso un solo ataque de AEH es demasiado. No dude en informar a su médico de todos los ataques, **no solo de los que considere graves.** Compartir esta información puede ayudar a su médico a comprender mejor el impacto total del AEH en su vida y cuándo puede ser el momento de ajustar su tratamiento.

CONSEJO N.º 3

Comparta sus objetivos personales de tratamiento

Lo que usted desea de su tratamiento es importante. **Su médico desea saber** todo lo posible sobre cómo le va con el AEH. El objetivo general del tratamiento para el AEH es ayudarlo a vivir una vida lo más normal posible.

CONSEJO N.º 4

Prepárese para su cita

- ☐ Lleve sus preguntas. Puede usar las páginas 5 a 7 de esta guía
- ☐ Prepárese para tomar notas o pida permiso para grabar la cita
- ☐ Traiga su diario de ataques o use las hojas de trabajo sobre los síntomas que se encuentran en las páginas 3 y 4 de esta guía
- ☐ Piense en qué tan controlado se encuentra su AEH con su plan de tratamiento actual
- ☐ Piense en cuántas veces usó su tratamiento de rescate en el último mes
- ☐ Lleve a un amigo o familiar para que le ayude a tomar notas y hacer preguntas

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAWNZERO?

DAWNZERO puede causar efectos secundarios graves, como reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas pueden incluir sarpullido, dificultad para respirar, dolor en el pecho, desmayos, mareos, sensación de mareo, hinchazón de la cara, los labios o la lengua y picazón. Deje de usar DAWNZERO y llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si tiene alguno de estos síntomas.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERO, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERO™
(donidalorsen) 80 mg / 0.8 mL
injection

Su hoja de trabajo de SÍNTOMAS DE AEH

Para que le sirva de guía para su próxima visita al médico, complete esta hoja de trabajo y llévela con usted.

Puede ayudarles tanto a usted como a su médico a hablar sobre su grado de satisfacción con su plan de manejo y tratamiento del AEH.

Acerca de sus ataques

¿Cuántos ataques tuvo?

- ☐ en el último mes
- ☐ en los últimos 3 meses

¿Qué tan severos son sus ataques?

- ☐ Leves
- ☐ Moderados
- ☐ Severos
- ☐ Muy severos

¿Con qué frecuencia usa su tratamiento de rescate?

- ☐ Una vez al mes
- ☐ Una vez cada 3 meses
- ☐ Una vez cada 6 meses
- ☐ Otra: _____

Si está recibiendo un tratamiento preventivo, ¿cuántas veces omitió una dosis?

- ☐ Nunca
- ☐ Una vez en 3 meses
- ☐ Entre 1 y 3 veces al mes
- ☐ Otra: _____

Impacto en la vida diaria

¿Qué tanto temor siente por su próximo ataque?

- ☐ Nada
- ☐ Algo de preocupación
- ☐ Siento ansiedad

En los últimos 3 meses, ¿cuántas veces dejó de hacer actividades debido a un ataque o a la preocupación por tener uno?

- ☐ Nunca
- ☐ Entre 1 y 2 veces
- ☐ 3 o más veces

Cuando se preocupó por un ataque, ¿cuáles son algunas de las actividades que evitó?

Esta hoja de trabajo se desarrolló para ayudarlo a iniciar una conversación con su médico. No está diseñada para sustituir la toma de decisiones médicas ni ofrecer asesoramiento médico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Los efectos secundarios más frecuentes de DAWNZERO incluyen reacciones en el lugar de inyección (como enrojecimiento o dolor en el lugar de inyección), infección de las vías respiratorias superiores, infección de las vías urinarias, molestia abdominal.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DAWNZERO. Informe a su proveedor de atención médica o equipo de tratamiento sobre los efectos secundarios que pueda tener.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERO, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERO
(donidalorsen) 80 mg / 0.8 mL
injection

Su hoja de trabajo de SÍNTOMAS DE AEH

Para que le sirva de guía para su próxima visita al médico, complete esta hoja de trabajo y llévela con usted.

Puede ayudarles tanto a usted como a su médico a hablar sobre su grado de satisfacción con su plan de manejo y tratamiento del AEH.

Sus objetivos de tratamiento

¿Qué tan satisfecho está con su tratamiento actual?



Muy descontento



Descontento



Aceptable



Contento



Muy contento

¿Qué es lo más importante para usted en un tratamiento? Clasifique lo siguiente del 1 al 5; 1 es lo más importante y 5 lo menos importante:

- Prevención de ataques de hinchazón
- Tener menos efectos secundarios, seguridad
- Cómo se administra (inyección, infusión, comprimido)
- Con qué frecuencia lo utilizo
- Otro (especifique): _____

Si ya está recibiendo tratamiento preventivo, ¿qué le gustaría que fuera diferente? Marque todas las opciones que correspondan:

- ☐ Todavía tengo demasiados ataques
- ☐ Se tarda mucho tiempo en prepararlo y usarlo
- ☐ Administrarlo es estresante
- ☐ Los efectos secundarios son molestos
- ☐ Tengo que usarlo con demasiada frecuencia

¿Cuáles son sus objetivos de tratamiento para el AEH?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No use DAWNZERO si ha tenido una reacción alérgica grave, incluida la anafilaxia, al donidalorsén o a cualquiera de los ingredientes de DAWNZERO.

Antes de usar DAWNZERO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si: está embarazada o planea quedar embarazada, está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si DAWNZERO puede dañar al bebé en gestación o si pasa a la leche materna y puede dañar al bebé.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERO, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERO
(donidalorsen) 80 mg / 0.8 mL
injection

PREGUNTAS para hacerle a su médico

Aquí tiene algunas preguntas que puede llevar a su próxima visita al médico.

Utilice esta página para tomar notas durante su conversación y escribir las respuestas de su médico.

Preguntas sobre DAWNZERO

¿Cómo funciona este tratamiento?

¿Cuándo debo esperar ver los resultados?

¿Cómo se administra y con qué frecuencia?

¿Seguiré usando mi tratamiento de rescate?

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

En el caso de que este sea el tratamiento adecuado para mí, ¿cómo paso de mi tratamiento actual a DAWNZERO?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Los efectos secundarios más frecuentes de DAWNZERO incluyen reacciones en el lugar de inyección (como enrojecimiento o dolor en el lugar de inyección), infección de las vías respiratorias superiores, infección de las vías urinarias, molestia abdominal.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DAWNZERO. Informe a su proveedor de atención médica o equipo de tratamiento sobre los efectos secundarios que pueda tener.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERO, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERO™
(donidalorsen) 80 mg / 0.8 mL
injection

PREGUNTAS para hacerle a su médico

Aquí tiene algunas preguntas que puede llevar a su próxima visita al médico.

Utilice esta página para tomar notas durante su conversación y escribir las respuestas de su médico.

Preguntas sobre DAWNZERA

¿Es seguro durante el embarazo?

¿Cómo se debe conservar DAWNZERA?

¿Qué apoyo hay disponible si estoy tomando DAWNZERA?

Haga sus propias preguntas:

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No use DAWNZERA si ha tenido una reacción alérgica grave, incluida la anafilaxia, al donidalorsén o a cualquiera de los ingredientes de DAWNZERA.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta a la FDA. Visite www.fda.gov/safety/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de DAWNZERA, también disponible en dawnzera.com.

DAWNZERA™ es una marca comercial de Ionis Pharmaceuticals, Inc. ©2026 Ionis Pharmaceuticals, Inc. US-DONI-2600147 v1.0 07/2026

DAWNZERA™
(donidalorsén) 80 mg / 0.8 mL
injection

	swelling attacks—and over time, that can start to feel normal.	de AEH y, con el tiempo, eso puede empezar a parecer normal.	and over time, that can start to feel normal.
28	But it doesn't have to be.	Pero no tiene por qué serlo.	But it doesn't have to be that way.
29	Even if you're on treatment, it's important to tell your doctor when HAE is still interfering with your daily activities.	Incluso si recibe tratamiento, es importante que le informe a su médico cuando el AEH sigue afectando sus actividades diarias.	Even if you're receiving treatment, it's important to let your doctor know when HAE continues to affect your daily activities.
30	Share your personal treatment goals	Comparta sus objetivos personales de tratamiento	Share your personal treatment goals
31	What you want from your treatment matters.	Lo que usted desea de su tratamiento es importante.	What you want from your treatment is important.
32	Your doctor wants to know everything they can about how you are doing with HAE.	Su médico desea saber todo lo posible sobre cómo le va con el AEH.	Your doctor wants to know as much as possible about how you're doing with HAE.
33	The overall goal of HAE treatment is to help you to live as normal a life as possible.	El objetivo general del tratamiento para el AEH es ayudarlo a vivir una vida lo más normal posible.	The overall goal of HAE treatment is to help you live as normal a life as possible.
34	Tip #4	Consejo n.º 4	Tip no. 4
35	Prepare for your appointment	Prepárese para su cita	Get ready for your appointment
36	Bring your questions.	Lleve sus preguntas.	Bring your questions with you.
37	You can use pages 5-7 of this guide	Puede usar las páginas 5 a 7 de esta guía	You can use pages 5 to 7 of this guide
38	Prepare to take notes or ask to record the appointment	Prepárese para tomar notas o pida permiso para grabar la cita	Get ready to take notes or ask for permission to record the appointment

74	Impact on daily life	Impacto en la vida diaria	Impact on daily life
75	In the past 3 months, how many times have you missed activities due to having an attack or worrying about having one?	En los últimos 3 meses, ¿cuántas veces dejó de hacer actividades debido a un ataque o a la preocupación por tener uno?	In the past 3 months, how many times have you stopped doing activities because of an attack or worry about having one?
76	Never	Nunca	Never
77	1-2 times	Entre 1 y 2 veces	1 to 2 times
78	3 or more times	3 o más veces	3 or more times
79	How fearful are you of your next attack?	¿Qué tanto temor siente por su próximo ataque?	How fearful are you of your next attack?
80	Not at all	Nada	Not at all
81	Somewhat worried	Algo de preocupación	Some concern
82	I'm anxious	Siento ansiedad	I feel anxious
83	What are some activities you have avoided when you worried about an attack?	Cuando se preocupó por un ataque, ¿cuáles son algunas de las actividades que evitó?	When you were worried about an attack, what are some of the activities you avoided?
84	This worksheet was developed to help you start a conversation with your doctor.	Esta hoja de trabajo se desarrolló para ayudarlo a iniciar una conversación con su médico.	This worksheet was developed to help you start a conversation with your doctor.
85	It is not intended to replace medical decision-making or provide medical guidance.	No está diseñada para sustituir la toma de decisiones médicas ni ofrecer asesoramiento médico.	It is not intended to replace medical decision-making or provide medical advice.
86	SELECT IMPORTANT SAFETY	INFORMACIÓN IMPORTANTE DE	SELECT IMPORTANT SAFETY